

紫草油新用

★ 龚丽萍 喻国华 (江西省中医院 南昌 330006)

关键词:紫草油;中医外科;临床应用

中图分类号:R 282.71 文献标识码:B

紫草油及其复方系紫草和复方紫草以食用植物油为基质制成的一种制剂。具有消炎、消肿、止痛、收敛、生肌、促进伤口愈合等功效,近年临床外治多种疾病取得满意的疗效。现简述如下。

1 紫草油的制法

紫草 50 g, 芝麻油 500 g, 把精选的紫草入芝麻油内浸泡 3 天, 以文火(必要时以武火)煎至药物微枯为度, 药用纱布四层过滤取油去渣, 装瓶备用。

2 临床应用

2.1 白塞氏病 以口腔溃疡为本病的第一个症状占 70% 左右, 整个病程中口腔溃疡的发生率高达 95% 以上, 始终无口腔病变者极少。用棉签蘸取紫草油点在溃疡面上, 每日 2-3 次。治疗 12 例患者, 完全愈合者 8 例, 基本愈合者 3 例, 大部分愈合者 1 例, 均需治疗 1 个月以上。

2.2 硬皮病 硬皮病可有广泛的小血管病变, 这是造成患者肢端硬化、溃疡、疼痛的主要原因之一。防止溃疡扩大, 预防坏死发生以及促进溃疡愈合是治疗的关键。我们用紫草油纱条湿敷外加入凡士林纱布无菌包扎, 每日 1 次, 7 天可看到明显效果, 1~2 个月可以收口。治疗 12 例患者, 痊愈(创口愈合, 疤痕形成)8 例, 显效(创口基本愈合, 无脓液和分泌物, 可见新鲜肉芽组织)2 例, 好转(创口缩小, 分泌物和渗液减少)1 例, 无效(创口改变不明显)1 例。用药时间最短 15 天, 最长 2 个月, 总有效率 91.67%。

2.3 变应性皮肤血管炎 表现为紫癜性斑丘疹, 鲜红色至紫红色, 压之不褪色。紫癜及紫癜性斑丘疹上可发生血泡、坏死及溃疡, 且这种溃疡属于难治性

溃疡, 很难收口。创面用紫草油纱布湿敷后外加入凡士林纱布无菌纱布包扎, 3~4 天换药一次。无感染、干燥的创面换药时可只去除包扎的外层纱布, 消毒后日涂紫草油 2~3 次, 对有感染者, 剪除局部湿敷纱布, 清除坏死感染的组织, 涂紫草油后包扎, 以利引流。治疗 15 例患者, 痊愈(创面愈合, 结痂脱落)10 例, 好转(创面边缘有新鲜肉芽组织生长)3 例, 无效(用药前后创面无变化)2 例。总有效率 86.67%。

2.4 激素依赖性皮炎 由于颜面部长期(3 周以上)在同一部位反复地外用类固醇激素, 停用后皮肤即出现明显的红斑、丘疹、脱屑、干燥、瘙痒触痛等皮炎症状, 再用该药, 上述症状及体征会很快减退, 如再停用, 皮炎又迅速再发, 并逐渐加重, 导致毛细血管扩张、多毛症、皮肤菲薄等。若使用其他非激素类药很难取效, 使用紫草油敷脸, 每日 1~2 次, 每次 15~20 分钟, 停用其他任何药物。治疗 32 例患者, 结果痊愈 20 例, 好转 10 例, 无效 2 例, 总有效率为 93.75%。

3 讨论

《神农本草经》记载山紫草, “治烧烫伤, 疮痈肿毒”。实验证明, 紫草所含物质具有解热、抗菌抗病毒以及抗炎作用。临床上常用来治疗各种发疹疾病。紫草油之植物油以选芝麻油为宜, “麻油能酸化溃疡面, 有利于肉芽组织及皮肤生长。紫草油利用这一特性, 常将其使用在一些难治性溃疡性皮肤病, 如硬皮病、变应性皮肤血管炎、白塞氏病等。因其抗感染力较弱, 一般不用于感染性创口。

(收稿日期:2007-12-21)