

注射用清开灵(冻干)治疗结核性脑膜炎 30 例

★ 肖绍武 (江西省胸科医院 南昌 330008)

摘要:目的:探讨清开灵治疗结核性脑膜炎的疗效。方法:60 例结核性脑膜炎患者随机分为两组,治疗组 30 例,在常规综合治疗基础上加用清开灵 1 200 mg 加入 5% 葡萄糖注射液 250 mL 中静脉点滴,每天 1 次,7~14 天为一疗程,对照常规综合治疗。结果:治疗组和对照组总显效率分别为 83.4% 和 56.6%,两组比较有显著性差异。结论:清开灵治疗结核性脑膜炎疗效显著。
关键词:清开灵;结核性脑膜炎

中图分类号:R 512.3 **文献标识码:**B

结核性脑膜炎是肺外结核中的重症结核病,目前仍是我国和发展中国家的常见病,存在着治疗周期长,病情易反复的特点。为探讨清开灵对结核性脑膜炎的治疗价值,对我科收治的 60 例结核性脑膜炎患者随机分组治疗,现总结报道如下:

1 临床资料

治疗组、对照组各 30 例,来自我科 2005 年 8 月~2006 年 7 月住院的结核性脑膜炎患者,病例均符合《结核病学》中的诊断标准。其中治疗组男 19 例,女 11 例,年龄 18~45 岁;对照组男 18 例,女 12 例,年龄 16~44 岁。两组患者在发热、头痛、呕吐、抽搐、意识状态等方面均无显著性差异。

2 治疗方法

两组均按常规治疗,包括抗痨、脱水降颅压、腰穿鞘内给药、激素、抗生素、止痉、对症及支持疗法。治疗组同时加用清开灵 1 200 mg 加入 5% 葡萄糖注射液 250 mL 中静脉点滴,每天 1 次,7~14 天为一疗程。

3 疗效标准

治疗 5~7 天,所有症状、体征消失为痊愈;7~10 天消失为显效;10~14 天消失为有效;14 天以上消失为无效。

4 治疗结果

4.1 两组临床症状持续时间比较 见表 1。

4.2 两组用药和疗效比较 见表 2。

表 1 两组临床症状持续时间比较

临床症状	平均持续时间/天		P 值
	治疗组	对照组	
发热	5(25 例)	8.5(26 例)	<0.01
头痛	6(24 例)	10(23 例)	<0.01
呕吐	3(21 例)	7(20 例)	<0.01
抽搐	2(10 例)	5(9 例)	<0.01
嗜睡	3(12 例)	5(11 例)	<0.01
昏迷	13(1 例)	17(2 例)	>0.05

表 2 两组疗效比较 例(%)

组别	例数	痊愈	显效	有效	无效
治疗组	30	17(56.7)	8(26.7)	2(6.6)	3(10)
对照组	30	10(33.3)	7(23.3)	8(26.7)	5(16.7)

从表 2 可见,治疗组和对照组总显效率(痊愈+显效)分别为 83.4% 和 56.6%,经 χ^2 检验,有显著性差异($P<0.05$)。

5 讨论

结核性脑膜炎患者在急性期多伴有不同程度的发热和意识障碍及抽搐等症状,常规治疗常使用镇静剂和大剂量激素退热,对意识状态观察存在着很大的困难和激素所致的副作用,而清开灵中胆酸、猪去氧胆酸具有清肝经邪热、止痉作用,栀子入心肺胃经而泻火、凉血解毒,水牛角凉血止血、泻火解毒、安神定惊,黄芩、板蓝根、金银花均具有清热之功效。方中各药配伍共奏清热解毒、化痰通络、醒神开窍之功,对缓解结核性脑膜炎患者急性期症状有很好的治疗作用,值得临床推广使用。

(收稿日期:2006-10-24)

欢 迎 投 稿 ! 欢 迎 订 阅 !