肝内胆管结石术后应用如意金黄通石汤经验

★ 陈小平 张绪平 刘朝晖 江邦坚 石磊 戴鸿斌 （江西省武宁县人民医院外二科 武宁 332300）

关键词：肝内胆管结石；术后；如意金黄通石汤
中图分类号：R 289.5 **文献标识码**：B

我院普外科 2002 年 1 月～2005 年 12 月，对肝内胆管结石术后患者使用中药自拟方如意金黄通石汤进行治疗，在临床症状改善及预防结石复发方面，取得较为满意的疗效，现总结如下：

1 临床资料

54 例中男 25 例，女 29 例；年龄 20～60 岁，平均 45.2 岁。术后随机分为治疗组（服用如意金黄通石汤）27 例，对照组 27 例（服用熊去氧胆酸），2 组患者年龄、性别、手术方式、手术时间、术后切口感染率、住院时间等指标均无显著性差别（$P>0.05$）。

2 治疗方法

两组术后常规抗炎、护肝，治疗组服用自拟方如意金黄通石汤（柴胡 10 g、黄芩 10 g、金钱草 20 g、鸡内金 20 g、海金砂 20 g、薏苡仁 20 g、竹茹 10 g、滑石 20 g、通草 6 g、白芍 15 g、连翘 10 g、知母 6 g、厚朴 10 g、甘草 6 g、茵陈 30 g）每天 1 剂，分早晚 2 次服用，疗程为半年；对照组服用熊去氧胆酸 0.2，每天 3 次，4 周为一疗程，3 个疗程后，隔 4 周治疗 1 个疗程，治疗时间亦为半年。两组均于术后第 3 天开始餐后服用，随防时间 0.5～3 年。

3 疗效观察

3.1 *疗效标准* 症状体征变化按照临床症状记分评定标准，从术后 3 天起，记录腹痛、腹胀、纳差、恶心呕吐等临床症状，半年后进行比较，治愈为治疗后积分较治疗前减少 91%，显效为治疗后积分较治疗前减少 70%～90%，有效为治疗后积分较治疗前减少 36%～69%，无效为治疗后积分较治疗前减少 35% 以下。

残石率和结石复发率，借助 B 超和（或）CT 检查并记录残石率和结石复发率，1 年内发现结石为残石，1 年后发现结石为复发结石。

3.2 *治疗结果* 治疗组治愈 10 例，显效 9 例，有效 7 例，无效 1 例，总有效率为 96.3%；对照组分别为 5、6、9、7 例，74%。两组比较，$\chi^2=5.28$，$P<0.05$。

2 组术后残石率、结石复发率比较：术后 6 个月治疗组和对照组的残石率分别为 11.1%（3/27）和 14.8%（4/27），差异无显著性（$P>0.05$）；术后 12 个月残石率分别为 3.7%（1/27）和 7.4%（2/27），差异无显著性（$P>0.05$）；排除 12 个月时复查发现残留结石病例 3 例（治疗组 1 例，对照组 2 例），统计其余 51 例，随访 0.5～3 年，治疗组结石复发率为 3.84%（1/26），对照 24%（6/25），两组比较差异有显著性意义（$P<0.05$）。

4 讨论

肝内胆管结石是外科常见病，其术后的高残石率，高复发率，一直是临床的一个棘手问题。

自拟方如意金黄通石汤主要成分为柴胡、金钱草、鸡内金、白芍、茵陈、黄芩、海金砂等，具有疏肝利胆，清热利湿，利胆排石功效。中医学虽无肝胆管结石病名，但根据临床表现，归属于“胁痛”、“黄疸”、“腹胀”等范畴。肝失调达，气机紊乱，疏泄失司，胆汁排泄不畅为其基本病机，本方具有改善肝脏代谢紊乱，改善肝胆管微循环，降低胆汁胆固醇水平的作用。自拟如意金黄通石汤在改善临床症状方面明显高于对照组，同时可显著减少术后结石的复发，有一定的临床推广应用价值。

（收稿日期：2007-08-30）

江西中医药
http://www.ajutcm.com