

新癍片的临床新用途

★ 肖瑛¹ 肖丰² 黄媛平¹ 朱伦中¹ 吁淑芳¹ (1 江西省南昌市第三医院 南昌 330008; 2 江西汇仁集团制药厂 南昌 330014)

关键词: 中药; 新癍片; 临床新用

中图分类号: R 289.5 文献标识码: B

本文介绍新癍片近年来的一些临床新用途。

1 主要成分与制剂

肿节风、三七、人工牛黄、猪胆汁膏、肖梵天花、珍珠层粉、水牛角浓缩粉、红曲等。片剂: 每片 0.32 g。

2 药理作用

新癍片口服给药, 在 57.5 ~ 460.0 mg/kg 剂量范围内, 对实验动物的急性和慢性炎症(巴豆油鼠耳水肿、角叉菜胶足肿、佐剂关节炎)都有明显的抗炎作用, 对实验动物的化学刺激和物理刺激引起的痛反应有明显的镇痛作用, 对实验动物的非感染性发热有明显的退热作用, 其最小剂量为 57.5 mg/kg, 显示起效快, 有效作用时间长特点。本品 LD₅₀ 为 1.312 g/kg。长期毒性试验表明 60 mg/kg 为安全有效剂量, 没有出现明显的毒副反应, 说明临床上所用的治疗量(每天 6 ~ 12 片)是安全可靠的。试验中注意到新癍片能使大鼠血清 SGPT 活性降低, 并有一定的量效关系。特别是镜检发现 120 mg/kg 剂量组, 部分大鼠肝细胞生长发育非常良好, 揭示本品尚有一定的保肝作用。中医学认为有清热解毒, 散瘀消肿之功。

3 临床新用途

3.1 治疗流行性腮腺炎 治疗 2 ~ 7 岁流行性腮腺炎 55 例, 每次 0.5 ~ 2 片, 每天 3 次, 同时以 2 ~ 4 片冷开水调化涂患处, 每天 1 或 2 次。结果: 中、轻症(2.9 ± 1.1)天痊愈, 重症(5.3 ± 1.4)天痊愈, 优于口服板蓝根颗粒、吗咪呱和维生素 C 加青黛外敷^[1]。

3.2 治疗癌痛 起始剂量每次 2 片, 每天 3 次, 温开水送服, 如止痛不理想, 加服 1 片, 至止痛满意, 一般 24 小时 10 片时皆可获满意的效果。经 54 例临床观察止痛总有效率为 83%, 一般用药后 0.5 ~ 2 小时见效, 起始剂量为 2 ~ 6 片, 止痛时间 8 ~ 12 小时。患者全身症状均有改善^[2]。对中、晚期肝癌也有一定疗效^[3]。

3.3 治疗急性乳腺炎 治疗组 40 例, 给予新癍片每次 4 片, 每天 3 次, 饭后服用; 每晚睡前先按摩病患处, 再用温水热敷半个小时, 然后将新癍片用凉开水调成糊状, 敷于病患处。对照组 31 例, 用甲硝唑每次 0.2 g, 每天 3 次, 饭后服用; 炎症较重者, 加服阿莫西林分散片每次 0.5 g, 每天 4 次; 症状缓解后减量; 另用庆大霉素注射液 8 万 U 外敷, 每天 1 次。半个月为一疗程, 戒烟、酒, 忌辛辣油腻食物。疗效: 两组分

别痊愈 14/4 例, 显效 16/6 例, 有效 7/13 例, 无效 3/8 例, 总有效率为 92.5%、74.2%。两组总有效率比较, 有统计学差异($P < 0.05$)。现代医学认为急性细菌性乳腺炎是由细菌侵入乳腺引起的乳房急性化脓性疾病。中医学称之为“乳痈”, 哺乳期妇女较易患之。中医认为本病外因多为产后哺乳时乳头破损、皲裂, 致风毒内侵乳络; 内因多为肝郁与胃热搏结, 乳络不通, 乳汁郁积, 气血瘀久化热酿毒而发, 治疗以清热泻火, 化瘀散结为基本原则。新癍片能清热化瘀, 消肿散结, 故临床疗效较好。此外, 新癍片对胃肠道影响较小, 对需较长时间服药者尤为适宜。

3.4 用于鼻腔手术后止痛 所有患者均由同一术者行功能性鼻内镜手术, 手术后采用凡士林纱条填塞鼻腔。治疗组 30 例, 于手术后 4 小时开始口服新癍片, 每次 3 片, 每天 3 次; 对照组 30 例, 手术后 4 小时肌肉注射布桂嗪(强痛定)0.1 g, 当晚及次日晚分别重复注射 1 次。结果: 治疗组用药前疼痛强度为(7.4 ± 1.5) cm, 用药后为(3.4 ± 0.9) cm; 鼻腔肿胀 16 例, 眼睑瘀血、肿胀 4 例。对照用药前疼痛强度为(7.4 ± 1.4) cm, 用药后(3.4 ± 1.2) cm; 鼻腔肿胀 24 例, 眼睑瘀血、肿胀 12 例。两组术后疼痛减轻程度的差异无统计学意义($P > 0.05$), 两组眼睑瘀血、肿胀的发生率差异有统计学意义($P < 0.01$)。鼻腔手术后, 由于组织损伤以及术后鼻腔填塞对组织的压迫及炎症刺激产生过敏反应, 引起一系列炎症介质释放; 局部微循环障碍导致局部瘀血、肿胀, 加重疼痛。新癍片具有清热、镇痛、消肿、散瘀的作用, 同时能促进血液循环, 达到止痛目的。新癍片应用于鼻腔手术后止痛, 给药途径方便、安全、有效^[4]。

参考文献

- [1] 林蒙. 新癍片治疗流行性腮腺炎 55 例[J]. 中国中西医结合杂志, 1997, 13(4): 214.
- [2] 骆学新. 新癍片治疗癌痛 54 例临床观察[J]. 浙江中医杂志, 1992, 27(9): 399.
- [3] 欧阳俊. 新癍片治疗中、晚期肝癌疼痛疗效观察[J]. 中成药, 1994, 16(8): 26.
- [4] 李云秋, 冯晓辉. 新癍片应用于鼻腔手术后止痛 30 例临床观察[J]. 中国中西医结合杂志, 2003, 23(7): 545.

(收稿日期: 2007-07-06)