

目达明冲剂治疗玻璃体积血 57 例

★ 薛喜梅¹ 任征² (1. 浙江中医药大学 2007 级硕士研究生 杭州 310006; 2. 浙江省中医院眼科 杭州 310006)

关键词: 目达明冲剂; 玻璃体积血; 中医药疗法

中图分类号: R 776.4 **文献标识码:** B

玻璃体积血在眼科临床为常见病、疑难病。许多眼科疾病,如视网膜静脉阻塞、视网膜静脉周围炎、眼外伤,以及全身病如糖尿病、高血压都能引起玻璃体积血。因玻璃体中留有胶质,又无血管,其代谢缓慢^[1],血液进入玻璃体内不仅使介质混浊,而且能刺激以巨细胞为主的慢性炎症,破坏玻璃体凝胶结构,造成玻璃体液化和后脱离^[2]。其严重影响视力,不少病例久治不愈,淤留目内,常引起玻璃体增殖机化及视网膜剥离,最终导致失明,治疗颇为棘手。近几年来,笔者用自拟方目达明冲剂治疗玻璃体积血,获得满意的效果,现报告如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 本组 85 例(90 只眼)均为浙江省中医院眼科 2005 年 1 月~2008 年 12 月门诊和住院患者,患者全部经眼科常规检查及 B 超检查确诊为玻璃体积血。随机分为治疗组和对照组。治疗组 57 例 60 只眼,对照组 28 例 30 只眼;男 45 例,女 40 例;年龄 18~82 岁,平均年龄 49.5 岁;发病时间 3 天~4 个月。发病原因:视网膜静脉阻塞 28 例(主干阻塞 17 例,分支阻塞 11 例),糖尿病 19 例,高血压动脉硬化 16 例,视网膜静脉周围炎 8 例,外伤 7 例,其他 7 例。

1.2 观察指标 (1) 视力变化情况查标准视力表。(2) 眼底积血情况用直接检眼镜检查,按 Forrester⁵ 级分类法^[3] 记录结果。I 级:玻璃体完全不透明;II 级:有轻微光反射,但眼底观察不清;III 级:经玻璃体间隙可见部分眼底;IV 级:玻璃体中央透明,周围见少量不透明物,大部分眼底清楚;V 级:清晰玻璃体,眼底清楚可见。

2 方法

2.1 治疗方法 治疗组:予目达明冲剂:丹参、生地、怀牛膝、三七粉、生蒲黄、黄芩炭、玄参、川芎、炙

甘草等共 11 味中药,制成冲剂,口服 1 日 2 次。对照组:复方血栓通胶囊,每次 3 片,日 3 次,口服;卵磷脂络合碘片(沃丽汀片),每次 3 片,日 3 次,口服。疗程均为 2 个月。

2.2 统计分析方法 应用 SPSS16.0 统计学软件对数据进行处理。两组治疗前后的变化采用秩和检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

3 疗效观察

3.1 疗效标准 治愈:玻璃体积血完全吸收,眼底清晰可见。视力恢复至患病前水平或 0.8 以上。显效:玻璃体积血大部分吸收,留下小量混浊,眼底可见;视力提高 0.2 以上。有效:玻璃体积血部分吸收,眼底部分可见;视力提高 0.1 以上。无效:玻璃体积血无吸收,视力无提高,眼底无法窥见。

3.2 治疗结果 治疗组治愈 21 只,显效 24 只,有效 11 只,无效 4 只,有效率 93.33%;对照组相应为 5、10、8、7 只,76.06%。两组比较差异有统计学意义($Z = -2.623, P < 0.01$)。

4 讨论

玻璃体积血属于中医学的“暴盲”、“血灌瞳神”、“云雾移睛”等范畴。中医学认为,离经之血即为瘀血,玻璃体积血是典型的血瘀证之一。遵“血实者决之”、“结者散之”、“留者攻之”之旨,因此治疗过去主要采用活血化瘀法。唐容川提出对治疗出血性疾病分“止血、消瘀、宁血、补血”四个阶段的认识,并对祛瘀和生新之间的辩证关系和具体方法进行深入的阐述。他提出的“瘀血不去,新血不生”的观点在眼科临床有十分重要的意义。对于玻璃体积血的治疗应处理好活血、化瘀、止血三者关系。目达明冲剂功能活血化瘀、止血宁血。方中丹参能“破癥除瘕”又能“破宿血,生新血”(《本草纲目》);川芎能调众脉,破瘀结宿血;淮牛膝能“散恶血,破瘕

苦参的混伪品——古羊藤

★ 廖志勇 (江西省新余市人民医院 新余 338000)

关键词:苦参;古羊藤;鉴别

中图分类号:R 282.5 文献标识码:B

在本地药市,见到一种当地群众及药农称为苦参的药材,经鉴定为萝藦科的马莲鞍 *Streptocaulon griffithii* Hook. f. 的干燥根,本品种在广西南部及西南部使用较为广泛,也称为“藤苦参”、“南苦参”,在当地常混为苦参。为了更好地地区分两种药材,现将二种药材介绍如下:

苦参为《中国药典》2005 年版收载品种,为豆科植物苦参 *Sophora flavescens* Ait. 的干燥根。苦参始载于《神农本草经》,列为中品,《本草纲目》收入草部山草类。陶弘景谓:“近道处处有之。叶极似槐叶,花黄色,子作荚,根味至苦恶。”苏颂谓:“其根黄色,长五七寸许,两指粗细。三五茎并生,苗高三四尺以来。叶碎青色,极似槐叶,春生冬凋。其花黄白色,七月结实如小豆子。”李时珍谓:“七八月结角如萝卜子,角内有子二三粒,如小豆而坚。”上述形态描述与《中国药典》规定的苦参及全国广泛应用的苦参是一同物,应为苦参的正品。苦参在广西分布较多,特别是桂北地区的全州、资源、灌阳等县。马莲鞍为壮族用药,主要分布广西南部及西南部,民间用于感冒发热,胃肠炎,痢疾等,古代本草未有记载,广西南部及西南部习用。

苦参呈长圆柱形,下部常有分枝,长 10 ~ 30 cm,直径 1 ~ 2 cm。表面灰棕色或棕黄色,具横向皮孔及细密纵皱纹。外皮薄,多破裂反卷,易剥落,剥落处显黄色,光滑。质硬,不易折断。断面纤维性。药材多切成块片状,片体厚 3 ~ 6 mm,切面黄白色,具放射状纹理及裂隙,有的可见同心性环纹。性味苦、寒,功能清热燥湿、杀虫、利尿。用于热痢、便血、黄疸尿闭、赤白带下、阴肿阴痒、湿疹、湿疮、皮肤瘙痒、疥癣麻风;外治阴道滴虫。

马莲鞍的干燥根呈长圆形,稍弯曲。上部稍粗大,下部渐细。表面黄棕色至暗棕色,稍显粗糙,有瘤状突起和不规则皱纹及裂纹。外皮较厚,不易剥落。药材多呈扁椭圆形片状,较细的根为长短不一的段,片的直径为 0.5 ~ 2 cm,厚 2 ~ 5 mm,折断面不平,断面皮部类白色,较厚,稍带粉性,可与木部剥离。木部微黄色,约占横切面的 3/5,射线纤细,放射状;导管显著,呈小孔状。气微,味苦。功能清热解暑,散瘀止痛。用于感冒发热、泄泻痢疾、胃痛、跌打肿痛、毒蛇咬伤。

(收稿日期:2009-09-07 责任编辑:曹征)

结”(《本草备要》),“走而能补,性善下行”(《本草经疏》);三七粉能“止血散结,定痛”(《本草纲目》);蒲黄能“凉血活血,止心腹诸痛”,“生则能行,熟则能止”(《本草纲目》);生地、玄参、黄芩炭能清热泻火凉血止血;炙甘草调和诸药。全方有活血化瘀、祛瘀生新、止血明目之功效。临床观察显示:目达明冲剂治疗玻璃体积血效果确切,有着广阔的前景。通过观察,我们发现玻璃体积血的预后与玻璃体积血时间的长短、出血量的多少、引起玻璃体积血的原因及是否是反复出血有很大的关系。出血时间短或量少,效果较好。出血时间越长或量较多或反

复出血者,吸收较慢,易引起一系列的并发症。因此玻璃体积血的早期治疗,促进积血的吸收,就显得尤为重要。

参考文献

- [1] 刘家琦,李凤鸣.实用眼科学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,1999:34.
- [2] 吴星伟,樊岚岚.中西医结合治疗眼底出血性疾病的思路与对策[J].中国中西医结合杂志,2001,21(8):624-626.
- [3] Forrester JV, Edger W, Millar W, et al. Enhancement of vitreous clotysis by urokinase: mode of action [J]. Exp Eye Res, 1982, 34: 895.

(收稿日期:2009-08-20 责任编辑:周茂福)