

苦参的混伪品——古羊藤

★ 廖志勇 (江西省新余市人民医院 新余 338000)

关键词:苦参;古羊藤;鉴别

中图分类号:R 282.5 文献标识码:B

在本地药市,见到一种当地群众及药农称为苦参的药材,经鉴定为萝藦科的马莲鞍 *Streptocaulon griffithii* Hook. f. 的干燥根,本品种在广西南部及西南部使用较为广泛,也称为“藤苦参”、“南苦参”,在当地常混为苦参。为了更好地地区分两种药材,现将二种药材介绍如下:

苦参为《中国药典》2005 年版收载品种,为豆科植物苦参 *Sophora flavescens* Ait. 的干燥根。苦参始载于《神农本草经》,列为中品,《本草纲目》收入草部山草类。陶弘景谓:“近道处处有之。叶极似槐叶,花黄色,子作荚,根味至苦恶。”苏颂谓:“其根黄色,长五七寸许,两指粗细。三五茎并生,苗高三四尺以来。叶碎青色,极似槐叶,春生冬凋。其花黄白色,七月结实如小豆子。”李时珍谓:“七八月结角如萝卜子,角内有子二三粒,如小豆而坚。”上述形态描述与《中国药典》规定的苦参及全国广泛应用的苦参是一同物,应为苦参的正品。苦参在广西分布较多,特别是桂北地区的全州、资源、灌阳等县。马莲鞍为壮族用药,主要分布广西南部及西南部,民间用于感冒发热,胃肠炎,痢疾等,古代本草未有记载,广西南部及西南部习用。

苦参呈长圆柱形,下部常有分枝,长 10 ~ 30 cm,直径 1 ~ 2 cm。表面灰棕色或棕黄色,具横向皮孔及细密纵皱纹。外皮薄,多破裂反卷,易剥落,剥落处显黄色,光滑。质硬,不易折断。断面纤维性。药材多切成块片状,片体厚 3 ~ 6 mm,切面黄白色,具放射状纹理及裂隙,有的可见同心性环纹。性味苦、寒,功能清热燥湿、杀虫、利尿。用于热痢、便血、黄疸尿闭、赤白带下、阴肿阴痒、湿疹、湿疮、皮肤瘙痒、疥癣麻风;外治阴道滴虫。

马莲鞍的干燥根呈长圆形,稍弯曲。上部稍粗大,下部渐细。表面黄棕色至暗棕色,稍显粗糙,有瘤状突起和不规则皱纹及裂纹。外皮较厚,不易剥落。药材多呈扁椭圆形片状,较细的根为长短不一的段,片的直径为 0.5 ~ 2 cm,厚 2 ~ 5 mm,折断面不平,断面皮部类白色,较厚,稍带粉性,可与木部剥离。木部微黄色,约占横切面的 3/5,射线纤细,放射状;导管显著,呈小孔状。气微,味苦。功能清热解暑,散瘀止痛。用于感冒发热、泄泻痢疾、胃痛、跌打肿痛、毒蛇咬伤。

(收稿日期:2009-09-07 责任编辑:曹征)

结”(《本草备要》),“走而能补,性善下行”(《本草经疏》);三七粉能“止血散结,定痛”(《本草纲目》);蒲黄能“凉血活血,止心腹诸痛”,“生则能行,熟则能止”(《本草纲目》);生地、玄参、黄芩炭能清热泻火凉血止血;炙甘草调和诸药。全方有活血化瘀、祛瘀生新、止血明目之功效。临床观察显示:目达明冲剂治疗玻璃体积血效果确切,有着广阔的前景。通过观察,我们发现玻璃体积血的预后与玻璃体积血时间的长短、出血量的多少、引起玻璃体积血的原因及是否是反复出血有很大的关系。出血时间短或量少,效果较好。出血时间越长或量较多或反

复出血者,吸收较慢,易引起一系列的并发症。因此玻璃体积血的早期治疗,促进积血的吸收,就显得尤为重要。

参考文献

- [1] 刘家琦,李凤鸣.实用眼科学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,1999:34.
- [2] 吴星伟,樊岚岚.中西医结合治疗眼底出血性疾病的思路与对策[J].中国中西医结合杂志,2001,21(8):624-626.
- [3] Forrester JV, Edger W, Millar W, et al. Enhancement of vitreous clotysis by urokinase: mode of action [J]. Exp Eye Res, 1982, 34: 895.

(收稿日期:2009-08-20 责任编辑:周茂福)